




ЗАБНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

Врач-дерматолог, косметолог, к.м.н., доцент РУДН, автор более 125 научных статей, медицинских рекомендаций для врачей, монографии.

« NOVACUTAN — новая линия биоревитализантов, созданная специально для тех, кто много и активно работает, чей ритм жизни требует качественного ухода за кожей без длительных, болезненных процедур, с быстрым, очевидным эффектом. Простота применения подкупает и врачей, и пациентов. А эффект отдохнувшей, восстановленной кожи заставляет сказать спасибо разработчикам данного продукта. »

АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТОКОЛА NIGHT-LIGHT NOVACUTAN УВІО



ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
ТЕХНИКА КАНЮЛЕЙ

ТЕХНИКА ВВЕДЕНИЯ:

Болюсно, микроболюсно, игла 30 G

ГЛУБИНА ВВЕДЕНИЯ: Субдермально

РАСХОД: 1 шприц/сеанс

ИНТЕРВАЛ: 2 недели

КУРС: 3 сеанса

- 1,9 — СКУЛОВЫЕ ТОЧКИ (БОЛЮСЫ 0,03 МЛ)
- 2 — УГОЛ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ (БОЛЮСЫ 0,05 МЛ)
- 3 — ПЕРИОРБИТАЛЬНЫЕ ТОЧКИ (БОЛЮСЫ 0,02 МЛ)
- 4 — ПАЛЬПЕБРОМАЛЯРНЫЕ ТОЧКИ (МИКРОБОЛЮСЫ 0,02 МЛ)
- 5 — ЩЕЧНАЯ ОБЛАСТЬ (БОЛЮСЫ 0,05 МЛ)
- 6 — ЩЕЧНЫЙ ЖИРОВОЙ ПАКЕТ (БОЛЮСЫ 0,05 МЛ)
- 7 — ПОДБОРОДОЧНЫЕ И ГУБОПОДБОРОДОЧНЫЕ ТОЧКИ (БОЛЮСЫ 0,05 МЛ)
- 8 — ВЕРХНЯЯ ГУБА И ОБЛАСТЬ НОСОГУБНОЙ СКЛАДКИ (БОЛЮСЫ 0,05 МЛ)

ТЕХНИКА ВВЕДЕНИЯ:

Инtradермально линейно-ретроградно при помощи канюли 25 G в веерной технике

РАСХОД: 1 шприц/сеанс

ИНТЕРВАЛ: 2 недели

КУРС: 3 сеанса

- 1 — ВЕЕР ВИСОЧНАЯ И СКУЛОВАЯ ОБЛАСТЬ (0,05 МЛ НА ВЕКТОР)
- 2 — ВЕЕР СКУЛОВАЯ ОБЛАСТЬ (0,05 МЛ НА ВЕКТОР)
- 3 — ВЕЕР ПРОЕКЦИЯ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ МЫШЦЫ (0,05 МЛ НА ВЕКТОР)
- 4 — ВЕЕР ЩЕЧНАЯ, НОСОГУБНАЯ И ГУБОКРАЕВАЯ ОБЛАСТЬ (0,05 МЛ НА ВЕКТОР)
- 5 — ВЕЕР ПРОЕКЦИЯ МОРЩИН-МАРИОНЕТОК (0,05 МЛ НА ВЕКТОР)

РЕЗУЛЬТАТ:

По результатам клинической оценки NOVACUTAN показал высокую эффективность в отношении гидратации, тонуса, цветности, выравнивании микрорельефа кожи. Все пациенты были полностью удовлетворены результатом. Гель NOVACUTAN легко вводится, экономично расходуется. Пробанты отметили слабую или умеренную болезненность в момент введения препарата. Ранний постпроцедурный период у пациентов сопровождался быстропроходящей (до 30-40 минут) гиперемией и транзиторными безболезненными папулами до 24 часов, проходившими самостоятельно.
НАСТОЯЩИМ РЕКОМЕНДУЕМ NOVACUTAN К ПРИМЕНЕНИЮ В ПРАКТИКЕ.

NOVACUTAN

PARIS • SEOUL • MOSCOW • BRUSSELS



5 степеней защиты для интенсивного омоложения

